

COMPRESSÃO MEDULAR MALIGNA: UMA EMERGÊNCIA EM ONCOLOGIA

Ângela Sofia Lopes Simões

Imferreira@esenf.pt

Enfermeira Graduada, Serviço de Cirurgia Mulheres – Hospital Amato Lusitano
Especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica
Pós-graduação em Cuidados Paliativos
Mestre em Tratamento de Suporte e Cuidados Paliativos no Doente Oncológico

A compressão medular maligna é uma emergência oncológica grave e frequente que requer um imediato reconhecimento e tratamento para alívio da dor e preservação das funções neurológicas. Os efeitos da compressão medular são demonstrados por alterações sensoriais, motoras e autónomas mínimas até episódios de dor severa ou, em casos mais graves, paralisia completa que afecta definitivamente a qualidade de vida do doente. A falha no diagnóstico correcto, conjuntamente com um limitado conhecimento do necessário referenciamento para tratamento imediato, traduz-se numa paralisia completa e, na maioria dos casos, irreversível, já que 90% dos doentes ambulatorios podem permanecer ambulatorios se agirmos prontamente. Sem terapêutica, a compressão medular maligna é fonte de uma significativa morbilidade e mortalidade, dor severa, paralisia, incontinência e um decréscimo da qualidade de vida.

PALAVRAS-CHAVE: oncologia; emergência; compressão medular.

ABSTRACT: Malignant spinal cord compression is a serious and frequent emergency in oncology which requires prompt diagnosis and treatment for pain relief and preservation of neurological function. The effects of spinal cord compression are demonstrated by sensory, motor and autonomous minima changes to episodes of severe pain or, in severe cases, complete paralysis that definitely affects the quality of life of patients.

Failure in the correct diagnosis in conjunction with a limited knowledge of appropriate referral for immediate treatment results in a complete paralysis and in most cases irreversible, since 90% of ambulatory patients may remain ambulatory if we act promptly. Without therapy, the malignant spinal cord compression is a significant source of morbidity and mortality, severe pain, paralysis, incontinence and a decreased quality of life.

KEYWORDS: oncology; emergency; spinal cord compression.

Introdução

A compressão medular maligna é a segunda emergência oncológica mais frequente e requer um imediato reconhecimento e tratamento para alívio da dor e preservação das funções neurológicas.¹ Segundo Husband et al, citado pelo M5CC Sub-group, é a maior causa de morbilidade nos doentes com cancro.² “...é uma das emergências oncológicas mais desafiantes.”³

Os efeitos da compressão medular são demonstrados por alterações sensoriais, motoras e autónomas mínimas até episódios de dor severa ou, em casos mais graves, paralisia completa que afecta definitivamente a qualidade de vida do doente.² No diagnóstico e tratamento da compressão medular deve estar envolvida toda a equipa multidisciplinar porque enquanto para